

Las hemorroides son muy comunes tanto en hombres como en mujeres y pueden desarrollarse por distintas causas. Localizadas en la parte inferior del recto, **las hemorroides pueden inflamarse** y causar sangrado, picazón, hinchazón u otros síntomas molestos.



Si tiene algún problema después del procedimiento, comuníquese con su médico.



2855 Boardwalk Drive  
Ann Arbor, MI 48104  
877.552.4027

[MTEndoscopy.com](http://MTEndoscopy.com)  
[customercare@mtendoscopy.com](mailto:customercare@mtendoscopy.com)



## LIGADURA DE HEMORROIDES SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO, ATENCIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES



La ligadura de hemorroides es un método muy común y conocido para tratar las hemorroides internas. A diferencia de los remedios de venta libre, que solo funcionan temporalmente, las bandas elásticas ofrecen una solución a largo plazo. La ligadura de hemorroides es un procedimiento no quirúrgico y prácticamente sin dolor, que un médico puede realizar en su consultorio.

El procedimiento consiste en colocar una pequeña banda elástica alrededor de la base de la hemorroide utilizando el sistema InSight™. La compresión creada por la banda elástica disminuye el suministro de sangre a la hemorroide, lo que hace que se encoja y finalmente se caiga. Esto deja una pequeña cicatriz que se cura en pocos días.



## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿QUÉ PUEDO COMER DESPUÉS DE MI PROCEDIMIENTO?

Se recomienda beber mucho líquido y aumentar la ingesta de fibra alimentaria, hacer una o dos heces blandas al día durante varios días después de la colocación de bandas.

### ¿NECESITO RESTRINGIR MIS ACTIVIDADES DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO?

Se recomienda evitar ejercicios intensos durante 1-2 días después del procedimiento de ligadura. Evite estar sentado por un período prolongado. A menos que se le haya recetado un medicamento en supositorio, no introduzca nada en su recto durante dos semanas después del procedimiento.

### ¿LA LIGADURA CAUSA DOLOR?

La ligadura hemorroidaria no causa dolor porque la ligadura se realiza por encima de la línea pectínea, una sección del recto que contiene una concentración muy baja de nervios sensibles al dolor. Algunos pacientes pueden sentir una leve incomodidad o una sensación de plenitud que generalmente puede ser tratada con paracetamol o ibuprofeno, según lo indicado por su médico.

### ¿CUÁNTAS INTERVENCIONES SE NECESITAN?

Su médico puede decidir tratar múltiples hemorroides en una sola visita y los estudios han demostrado que la ligadura de múltiples bandas es segura y eficaz. Esto puede variar de un paciente a otro y será determinado por su médico.

### ¿NO DEBERÍAN EXTIRPARSE QUIRÚRGICAMENTE TODAS LAS HEMORROIDES?

No, se estima que el 95% de las hemorroides se pueden tratar utilizando un sistema de bandas de ligadura como el InSight.

### ¿QUIÉNES SON CANDIDATOS IDEALES PARA LA LIGADURA?

La gran mayoría de los pacientes con enfermedad hemorroidal son excelentes candidatos para el procedimiento. El InSight es adecuado para prácticamente todos los pacientes con enfermedad de grado I a III.

### ¿CÓMO FUNCIONA LA LIGADURA?

Se coloca una pequeña banda elástica sin látex alrededor de la base de la hemorroide, que corta el suministro de sangre al área. En unos pocos días, el tejido y la banda se encogerán y se caerán, generalmente sin que te des cuenta.

