

Les hémorroïdes sont très fréquentes chez les hommes et les femmes et peuvent se développer à partir de différentes causes. Situées dans le rectum inférieur, **les hémorroïdes peuvent s'enflammer** et causer des saignements, des démangeaisons, de l'enflure ou d'autres symptômes gênants.



Si vous avez des problèmes après la procédure, contactez votre médecin.



2855 Boardwalk Drive
Ann Arbor, MI 48104
877.552.4027

[MTEndoscopy.com](https://www.MTEndoscopy.com)
customercare@mtendoscopy.com



LA LIGATURE DES HÉMORROÏDES SUIVI DU TRAITEMENT, SOINS & FAQ



La ligature des hémorroïdes est une méthode très courante et bien connue de traitement des hémorroïdes internes. Contrairement aux remèdes en vente libre, qui ne fonctionnent que temporairement, les bandes élastiques offrent une solution à long terme. La ligature des hémorroïdes est une procédure non chirurgicale, pratiquement sans douleur, qu'un médecin peut effectuer dans son bureau.

La procédure consiste à placer une petite bande élastique autour de la base de l'hémorroïde à l'aide du système InSight™. La compression créée par la ligature diminue l'apport sanguin à l'hémorroïde, la faisant rétrécir et éventuellement tomber. Cela laisse une petite cicatrice qui guérit en peu de jours.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUE PUIS-JE MANGER APRÈS LA PROCÉDURE ?

Il est recommandé de boire beaucoup de liquides et d'augmenter l'apport en fibres en faisant un ou deux selles par jour pendant plusieurs jours après la ligature.

DOIS-JE RESTREINDRE MES ACTIVITÉS APRÈS LA PROCÉDURE ?

Il est conseillé d'éviter de l'exercice intensif pendant 1-2 jours après votre procédure de ligature. Évitez de rester assis pendant une période prolongée. À moins qu'on ne vous ait prescrit un médicament anorectique, ne mettez rien dans votre rectum pendant deux semaines après votre intervention.

LA LIGATURE CAUSE DES DOULEURS ?

La ligature des hémorroïdes est pratiquement sans douleur parce que la ligature se fait au-dessus de la ligne dentée, une section du rectum qui contient une très faible concentration de nerfs sensibles à la douleur. Certains patients peuvent éprouver un léger inconfort ou une sensation de plénitude qui peut généralement être traitée avec de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène selon les instructions de votre médecin.

COMBIEN D'INTERVENTIONS SONT NÉCESSAIRES ?

Votre médecin peut décider de traiter plusieurs hémorroïdes en une seule visite et des études ont montré que la ligature multi-bande est sûre et efficace. Cela peut varier d'un patient à l'autre et sera déterminé par votre médecin.

TOUTES LES HÉMORROÏDES NE DOIVENT-ELLES PAS ÊTRE ENLEVÉES CHIRURGICALEMENT ?

Non, on estime que 95% des hémorroïdes peuvent être traitées à l'aide d'un système de bandes de ligature comme InSight.

QUI SONT LES CANDIDATS IDÉAUX POUR DE LA LIGATURE ?

La grande majorité des patients atteints de maladie hémorroïdaire sont d'excellents candidats pour la procédure. L'InSight convient à pratiquement tous les patients atteints de la maladie de grades I à III.

COMMENT FONCTIONNE LA LIGATURE ?

Un minuscule élastique sans latex est placé autour de la base de l'hémorroïde, ce qui coupe l'apport sanguin à la région. En quelques jours, le tissu et la bande rétréciront et tomberont, généralement sans même que vous vous en rendez compte.

